

*Г. Лозову (инж.)
на замещение.*

А. Мотин

СЕКРЕТНО
РАСЕКРЕЧЕНО

ОБЗОР ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ С.С.С.Р.

ЗА 1937-1939 гг. и за I полугодие 1940 г.

(ПО ОСТРО ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ)

2 инв 3104

*Секретный
10/12/56*

Секретный Отдел Госплана С.С.Р.	
Индекс	2919/28/11
	1937 г.

30

Настоящий обзор имеет целью показать движение заболеваемости населения СССР по остро-инфекционным болезням.

Данные за 1937-1939 г.г. приведены по годовым отчетам, а за 1 полугодие 1940 г. - по текущей месячной отчетности.

По УССР и БССР - данные без западных областей.

Обзор охватывает движение остро-инфекционных заболеваний, учитываемых в 1939 г. Наркомздравом СССР по основной номенклатуре:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Сыпной тиф. | 9. Коклюш |
| 2. Скарлатина | 10. Малярия |
| 3. Дифтерия | 11. Грипп |
| 4. Брюшной тиф | 12. Оспа натуральная |
| 5. Паратиф | 13. Церебро-спинальный менингит |
| 6. Дизентерия и гемоколиты | 14. Эпидемическ. энцефалит. |
| 7. Поносы у детей в возрасте до 2-х лет | 15. Полиомиелит |
| 8. К о р ь | 16. Возвратный тиф. |

Число заболеваний сыпным тифом в СССР на протяжении последних лет систематически снижается.

В 1939 г. заболело сыпным тифом на 30,4% меньше чем в 1938г. и на 42,1% меньше чем в 1937 г. Однако по Закавказским республикам и Туркменской ССР за последние 2 года наблюдается рост заболеваемости, достигающий за 1939 год по Армянской ССР +150,0%; по Азербайджанской ССР +119,1%; по Туркменской ССР +57,2%.

В I-м полугодии 1940 г. заболеваемость сыпным тифом по СССР продолжала снижаться. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижение составляет 23,0%, но наряду с этим отдельные республики дают весьма значительный рост заболеваемости (БССР Карело-Финская ССР)

Заболело сыпным тифом (человек)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I по- лугодие 1940г.	% изме- нения (+) 1939г. к 1938г.	% из- менения I полу- год. 1940г. к I по- лугодию 1939г.	Заболеваемость на 10000 нас.	
							В 1938г.	В 1939г.
С С С Р	38635	73783	51361	28258	- 30,4	- 23,0	4,3	3,0
В том числе:								
Р С Ф С Р	69552	59927	38374	19451	- 36,0	- 29,8	5,5	3,5
У С С Р	7685	5346	4735	3156	- 11,4	+ 2,8	1,7	1,5
Б С С Р	4182	2284	1893	1707	- 17,1	+ 54,6	4,1	3,4
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР:	254	330	723	507	+119,1	- 16,6	1,0	2,3
ГРУЗИНСКАЯ ССР	473	611	770	195	+ 26,0	- 60,1	1,7	2,2
АРМЯНСКАЯ ССР	160	134	335	279	+150,0	+ 12,5	1,0	2,6
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	338	451	709	460	+ 57,2	- 33,8	3,6	5,7
УЗБЕКСКАЯ ССР	934	896	549	295	- 38,7	- 35,2	1,4	0,9
ТАДЖИКСКАЯ ССР	47	152	136	133	- 10,5	+ 9,9	1,0	0,9
КАЗАХСКАЯ ССР	825	1144	1047	715	- 3,5	- 12,8	1,9	1,7

(продолжение)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I полугодие 1940г.	% измене ния (+) 1939г. к 1938г.	% из- менения I полугод. 1940г. к I полу- годию 1939г.	Заболелаемость на 10000 нас. в 1938г.	в 1939г.
КИРГИЗСКАЯ ССР	1509	731	782	401	+ 7,0	- 35,3	5,0	5,4
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР х)	157	4	41	44	ув. в 10 раз	+ 29,4	0,1	0,9
МОЛДАВСКАЯ ССР х) ..	268	151	101	118	- 33,1	+162,2	2,5	1,7
Ж.д. транспорт	2060	1490	1055	744	-29,2	+20,0	-	-
Водный транспорт ...	191	132	111	53	- 15,9	- 30,3	-	-

х) В границах бывш. АССР

Заболелаемость сыпным тифом по СССР в 1939 г. на 10.000 населения состав. 3,0
 По РСФСР наиболее высокие показатели заболеваемости имеются:
 в Чувашской АССР - 17,5; Дагестанской АССР - 14,2; Орловской области - 12,5;
 Марийской АССР - 10,3; Мордовской АССР - 9,0; Тамбовской обл. - 8,3; Удмуртской
 АССР - 8,1; Рязанской обл. - 7,1.

По имеющимся сообщениям с мест отдельные случаи заболеваний сыпным тифом диагностировались первоначально, как грипп и лишь через длительный период времени распознавался сыпной тиф (области: Рязанская, Тульская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Помельская, Витебская). Такие случаи способствовали распространению заболеваемости сыпным тифом.

В 1939 г. по СССР было госпитализировано 97,2% больных сыпным тифом. В БССР госпитализация достигает 99,9%. Наименьший охват госпитализацией отмечается в Туркменской ССР - 84,3% и в Казахской ССР - 85,2%.

С К А Р Л А Т И Н А

Заболееаемость скарлатиной за последние годы по Союзу также продолжает снижаться. В 1939 г. заболееаемость снижена на 22,4%. В то же время по отдельным республикам наблюдалось увеличение числа заболеваний: по Туркменской ССР - на 82,8% и по Таджикской ССР - на 34,7%.

В I-м полугодии 1940 года почти по всей территории Союза ССР продолжалось снижение заболееаемости скарлатиной. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года заболееаемость снизилась на 39,2%. Лишь в Таджикской ССР и Узбекской ССР наблюдался рост заболееаемости:

Заболело скарлатиной (человек)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I по- лугодие 1940г.	% изме- нения (+) 1939г. к 1938г.	% из- менения I полу- год. 1940г. к I по- лугод. 1939г.	Заболееаемость на 10.000 нас. в 1938г.	в 1939г.
С С С Р	511156	467973	363205	95475	- 22,4	- 39,2	27,5	21,3
В том числе:								
РСФСР	336722	305940	222452	62502	- 27,3	- 38,3	28,0	20,4
УССР	107441	98120	86775	17151	- 11,3	- 46,5	31,7	28,0
БССР	13402	9853	10687	3058	+ 8,5	- 27,7	17,7	19,2
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР ..	3832	5944	4591	1359	- 22,8	- 50,3	18,5	14,3
ГРУЗИНСКАЯ ССР	5549	4153	3283	1101	- 20,9	- 40,1	11,7	9,3
АРМЯНСКАЯ ССР	2467	2861	2743	554	- 4,1	- 61,7	22,3	21,4
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	330	186	340	97	+ 82,8	- 27,6	1,5	2,7
УЗБЕКСКАЯ ССР	2597	2213	2159	907	- 2,4	+ 48,0	3,5	3,4
ТАДЖИКСКАЯ ССР	232	239	322	259	+ 34,7	+ 99,2	1,6	2,2
КАЗАХСКАЯ ССР	5094	5684	5885	1591	+ 3,5	- 25,5	9,2	9,6
КИРГИЗСКАЯ ССР	1504	1402	972	353	- 30,7	- 0,8	9,6	6,7

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I по- лучодие 1940г.	% изме- нения (+) 1939г. к 1938г.	% из- мене- ния I полу- год. 1940г. к I по- лучод. 1939г.	Заболелаемость на 10.000 нас. в . . в 1938г. 1939г.
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР, х) ..	1190	1239	824	183	- 33,5	-64,7	26,4 17,6
МОЛДАВСКАЯ ССР х)	2395	3157	1107	148	- 64,9	-70,3	52,4 18,4
Ж.д.транспорт	25066	23622	18291	5365	-22,6	-30,7	- -
Водный транспорт	3335	3365	2774	847	-17,6	-34,3	- -

х) В границах бывш. АССР

Заболелаемость скарлатиной в 1939 г. по СССР на 10.000 насел. составляет 21,3.

По областям РСФСР наиболее высокие показатели заболеваемости имеют: в Ленинграде - 54,5; г. Москве - 50,4; Мурманской области - 47,2; Московской обл. - 35,0; Горьковской обл. - 30,5; Ярославской обл. - 30,9.

Госпитализация больных скарлатиной за 1939 год по Союзу ССР в целом составила 92,3%. В БССР охват госпитализацией достигает 95,9%. Наименьшая госпитализация больных: в Таджикской ССР - 68,3%; в Грузинской ССР - 71,4%; в Киргизской ССР - 78,0%.

Число заболеваний дифтерией за последние годы резко увеличивается. В 1939 г. заболело дифтерией на 20,4% больше чем в 1938 г. и на 72,8% больше чем в 1937 г. Наибольший процент роста (1939 г. к 1937 г.) приходится: на РСФСР + 85,5%, Узбекскую ССР + 77,5%; Казахскую ССР + 70,3%.

В 1-м полугодии 1940 года имеется незначительное снижение заболеваемости дифтерией по СССР - на 2,7%. В то же время наблюдается рост заболеваемости в некоторых республиках:

Заболело дифтерией (человек)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I полугодие 1940г.	% изменения (+/-) 1939г. к 1938г.	% изменения 1 полугод. 1940г. к I полуодию 1939г.	Заболеваемость на 10.000 нас.	
							в 1938г.	в 1939г.
СССР	96861	138968	167361	71116	+ 20,4	- 2,7	8,2	9,8
В т.ч.								
РСФСР	69100	103747	128204	54656	+ 23,6	- 3,0	9,5	11,7
УССР	8581	9288	11095	4916	+19,5	+10,9	3,0	3,6
БССР	4080	5102	5464	2377	+ 7,1	+ 1,6	9,2	9,8
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР ..	1389	1477	1205	392	- 18,4	-34,2	4,6	3,8
ГРУЗИНСКАЯ ССР	2271	2464	2367	1065	- 3,9	- 0,4	7,0	6,7
АРМЯНСКАЯ ССР	427	360	297	125	- 17,5	-26,9	2,8	2,3
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	481	585	551	176	- 5,8	-28,7	4,7	4,4
УЗБЕКСКАЯ ССР	2041	3636	3623	1479	- 0,4	- 6,9	5,8	5,8
ТАДЖИКСКАЯ ССР	574	382	549	202	+ 43,7	-16,9	2,6	3,7
КАЗАХСКАЯ ССР	1749	2869	2979	1085	+ 3,8	-18,2	4,7	4,8
КИРГИЗСКАЯ ССР	445	708	810	343	+ 14,4	+29,9	4,9	5,6
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР х)	137	228	190	124	- 16,7	+33,3	4,9	4,1
МОЛДАВСКАЯ ССР х) ...	84	100	80	30	- 20,0	-21,1	1,7	1,3
Ж.д. транспорт	4863	7106	8713	3576	+ 22,6	- 5,0	-	-
Водный транспорт	639	916	1234	570	+ 34,7	+ 9,0	-	-

х) в границах бывш. АССР

9,8. Заболеваемость дифтерией на 10.000 населения по СССР в 1939 г. составляет

По областям РСФСР наиболее высокие показатели заболеваемости дифтерией имеют:
г. Москва - 43,6; Московская обл. - 27,6; Ивановская обл. - 23,3;
Рязанская обл. - 20,7; Горьковская область - 19,9; Свердловская область - 16,7;
г. Ленинград - 16,6.

В 1939 г. по СССР было госпитализировано 84,6% больных дифтерией. Наибольшего процента госпитализации больных достигла Армянская ССР - 91,9. Самый низкий процент госпитализации больных отмечается в: Грузинской ССР - 60,9; Казахской ССР - 74,0; Киргизской ССР - 75,1.

107

Снижение заболеваемости брюшным тифом продолжалось в I-м полугодии 1940 года и выразилось в целом по СССР 22,2%. При этом в ряде республик имел место рост заболеваемости.

Заболело брюшным тифом (человек)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I по- лугодие 1940г.	% изме- нения (+) 1939г. к 1938г.	% из- менения I полу- годия 1940г. к I по- лугодию 1939г.	Заболелаемость на 10.000 нас.	
							в 1938г.	в 1939г.
СССР	108270	106285	80990	24565	- 23,8	- 22,2	6,5	4,8
В том числе:								
РСФСР	68291	76061	53142	16050	- 30,1	- 30,0	7,0	4,9
УССР	19614	13429	11111	2764	- 17,3	- 12,0	4,3	3,6
БССР	2063	2131	1848	852	- 13,3	+ 6,2	3,8	3,3
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР	1372	1044	1075	229	+ 3,0	- 30,8	3,3	3,3
ГРУЗИНСКАЯ ССР ...	3106	3078	2361	609	- 23,3	- 32,5	8,7	6,7
АРМЯНСКАЯ ССР	1623	957	1310	350	+ 36,9	- 16,3	7,5	10,2
ТУРКМЕНСКАЯ ССР ...	883	342	558	193	+ 63,2	+ 9,7	2,7	4,4
УЗБЕКСКАЯ ССР	4906	3137	3676	1508	+ 17,2	+ 38,3	5,0	5,9
ТАДЖИКСКАЯ ССР ...	1142	755	855	467	+ 13,2	+ 130,0	5,1	5,8
КАЗАХСКАЯ ССР	2507	3043	2751	886	- 9,6	+ 1,0	5,0	4,5
КИРГИЗСКАЯ ССР	1062	966	1265	390	+ 31,0	+ 8,6	6,6	8,7
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР х)	304	261	173	43	- 33,7	- 59,0	5,6	3,7
МОЛДАВСКАЯ ССР х)	259	181	181	31	-	- 34,1	3,0	3,0
Водный транспорт	1138	900	684	193	- 24,0	+ 14,9	-	-
Кроме того:								
жел.д.транспорт	св.н.	4759	3370	1200	- 29,2	- 12,2	-	-

х) в границах бывш. АССР

Заболеваемость на 10.000 населения по СССР в 1939 г. составляет 4,8.

Отмечаются на территории РСФСР самые высокие показатели заболеваемости по: Северо-Осетинской АССР - 11,7; Бурято-Монгольской АССР - 10,4; Читинской обл. - 10,0; Рязанской обл. - 8,5; Красноярскому краю - 7,7; Московской обл. - 7,3.

За 1939 г. по СССР было госпитализировано 93,5 больных брюшным тифом. По отдельным республикам лучше всего поставлена госпитализация в БССР - 98,9%. Отстающими республиками по госпитализации больных брюшным тифом являются: Грузинская ССР - 80,3%; Узбекская ССР - 82,8%; Туркменская ССР - 83,2% и др.

ДИЗЕНТЕРИЯ И ГЕМОКОЛИТЫ

104

Заболееваемость дизентерией и гемоколитом в 1939 г. по сравнению с 1938 г. незначительно снизилась. По сравнению с 1937 г. заболееваемость выросла на 59,9%.

В I-м полугодии 1940 г. заболееваемость по СССР в целом, осталась почти на уровне соответствующего периода прошлого года (- 2,0%)

Заболело дизентерией и гемоколитом (человек)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I по- лугодие 1940г.	% измене- ния (+) 1939г. к 1938г.	% из- менения I полу г. 1940г. к I по- лугодию 1939г.	Заболееваемость на 10000 нас.	
							в 1938г.	в 1939г.
С С С Р	407402	701081	651467	195413	- 7,1	- 2,0	41,1	38,2
В т.ч.								
РСФСР	262764	485283	439212	126932	- 9,5	+ 3,4	44,4	40,2
У С С Р	45305	48078	49131	16524	+ 2,2	+12,8	15,5	15,9
Б С С Р	6961	11964	12231	2496	+ 2,2	-14,3	21,5	22,0
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР:	12579	18114	13391	2802	- 23,3	-47,6	56,4	43,3
ГРУЗИНСКАЯ ССР	10913	13918	10796	2592	- 22,4	-43,3	39,3	30,5
АРМЯНСКАЯ ССР	3230	3615	3084	606	- 14,7	-36,3	28,2	24,1
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	5303	8291	6847	3302	- 17,4	-11,6	66,1	54,6
УЗБЕКСКАЯ ССР	19726	30479	33062	12013	+ 8,5	-22,1	48,5	52,6
ТАДЖИКСКАЯ ССР	8922	13161	13455	6170	+ 2,2	+ 3,2	88,6	90,6
КАЗАХСКАЯ ССР	7328	20163	20934	6518	+ 3,8	- 4,8	32,8	34,1
КИРГИЗСКАЯ ССР	2538	3900	4658	2416	+ 19,4	+21,2	26,7	31,9
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР. х)	1328	2344	1816	896	- 22,5	+47,9	50,0	38,7
МОЛДАВСКАЯ ССР х)	480	776	1049	320	+ 35,2	-24,2	12,9	17,4
Ж.д. транспорт	16239	34077	34389	9795	+ 0,9	-11,1	-	-
Водный транспорт	3786	6918	6912	2031	- 0,1	-11,4	-	-

х) В границах бывш. АССР

Заболеваемость по СССР в 1939 г. на 10.000 населения составляет 38,2.

По РСФСР особенно высокие показатели заболеваемости имели место: в Бурят-Монгольской АССР - 180,1; в Приморском крае - 126,6, Мурманской обл. - 109,1; г. Москве - 97,3; Калмыцкой АССР 95,5; АССР Немцев Поволжья - 85,3.

ПОНОСЫ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 2-х ЛЕТ.

102

(включая токсическую диспепсию грудного возраста)

Детские поносы до 2-х лет одно из наиболее массовых заболеваний. Число зарегистрированных заболеваний в 1939 г. превышает 3 миллиона. Рост заболеваемости в 1939 г. к 1937 г. составляет 104,3%.

В I-м полугодии 1940 г. наблюдается значительное уменьшение заболеваемости детским поносом, выразившееся по СССР в целом на 19,9%.

Заболело поносом детей в возрасте до 2-х лет.

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I по- лугодие 1940г.	% изме- нения (+) 1939г. к 1938г.	% из- менения I полу- год. к I по- лугодию 1939г.	Заболеваемость на 10.000 нас.	
							в	в
							1938г.	1939г.
СССР	1498481	2868762	3061848	782668	+ 6,7	- 19,9	168,3	179,6
В том числе:								
РСФСР	914528	1892570	1965441	494943	+ 3,9	- 18,7	173,2	179,9
УССР	274434	489879	538030	117615	+ 9,8	- 30,5	158,2	173,8
БССР	23946	64186	67528	16366	+ 5,2	+ 4,4	115,2	121,3
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР:	35160	39099	43030	7389	+10,1	- 54,7	121,8	134,0
ГРУЗИНСКАЯ ССР	48433	54613	54269	10119	- 0,6	- 46,6	154,2	153,2
АРМЯНСКАЯ ССР	31150	33256	41939	8179	+26,2	- 44,0	259,4	327,1
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	16496	22218	27718	8992	+24,8	- 36,6	177,2	221,0
УЗБЕКСКАЯ ССР	60428	93446	124223	51606	+32,9	+ 8,2	148,8	197,7
ТАДЖИКСКАЯ ССР	11099	18073	22244	9296	+23,1	+ 0,5	121,7	149,8
КАЗАХСКАЯ ССР	46985	83119	110017	37661	+32,4	+ 4,0	135,2	179,0
КИРГИЗСКАЯ ССР	13574	31578	23046	9505	-27,0	+ 15,9	216,4	158,0
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР х)	2779	10365	8186	2067	-21,0	- 45,2	221,0	174,5
МОЛДАВСКАЯ ССР х) ..	5241	11313	11719	1570	+ 3,6	- 66,8	187,9	194,7
Водный транспорт ...	14228	25047	24458	7360	- 2,4	- 18,6	-	-
Кроме того ж.д. транспорт	н.св.	н.св.	106274	33814	-	+ 8,0	-	-

х) в границах бывш. АССР

Заболеваемость на 10.000 населения по СССР в 1939 г. составляет 179,6.

По РСФСР наиболее высокая заболеваемость отмечается: в АССР Немцев Поволжья - 358,9; Северо-Осетинской АССР - 345,5; Мурманской обл. - 345,8; Краснодарскому краю - 329,7; Сталинградской обл. - 332,6; Молотовской обл. - 305,7; Саратовской обл. - 305,9; Челябинской обл. - 304,3 и др.

Заболееваемость корью в 1939 г. осталась почти на уровне прошлого года. Однако по сравнению с 1937 г. отмечено увеличение заболеваемости на 7,0%, а отдельные республики за этот период дают весьма значительный рост: Азербайджанская ССР - +102,0%, БССР +83,8%; Казахская ССР +60,0% и т.д.

Заболееваемость корью в I-м полугодии 1940 г. значительно снизилась. В целом по СССР снижение составляет -25,2%.

По отдельным республикам снижение достигает: по Армянской ССР - 83,5%, по Грузинской ССР - 60,3%, по УССР - 50,7%.

Заболело корью (человек)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I по- лугодие 1940г.	% из- мене- ния (+) 1939г. к 1938г.	% из- менения I полу- год. 1940г. к I по- лугодию 1939г.	Заболееваемость на 10.000 нас.	
							в 1938г.	в 1939г.
СССР	1017570	1072810	1088592	466261	+ 1,5	- 25,2	62,9	63,9
В т.ч.								
РСФСР	716689	641092	692237	321091	+ 8,0	- 15,7	58,7	63,3
УССР	131287	233484	168650	47670	-27,2	- 50,7	75,4	54,5
БССР	17642	28722	32429	7078	+12,9	- 50,8	51,6	58,2
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР ..	10956	16341	22135	7143	+85,5	-61,3	50,9	69,0
ГРУЗИНСКАЯ ССР	14020	13342	17083	5192	+28,0	- 60,3	37,7	48,2
АРМЯНСКАЯ ССР	8857	10363	13070	1791	+26,1	- 83,5	80,8	102,0
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	5958	3307	6291	3371	+90,2	- 32,0	26,4	50,2
УЗБЕКСКАЯ ССР	14584	15456	21098	11930	+36,5	- 31,5	24,6	33,6
ТАДЖИКСКАЯ ССР	2412	3320	3188	3392	- 4,0	+ 50,7	22,4	21,5
КАЗАХСКАЯ ССР	20579	23999	32917	17631	+37,2	+ 15,2	39,0	53,6
КИРГИЗСКАЯ ССР	4422	6041	5831	5886	- 3,5	+ 48,5	41,4	40,0
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР х)	4826	2838	2658	1168	- 6,3	- 32,2	60,5	56,7
МОЛДАВСКАЯ ССР х) ...	1410	9818	2003	436	-79,6	- 71,9	163,1	33,3
ж.д. транспорт	55775	55109	58923	26842	+ 6,9	- 24,2	-	-
Водный транспорт	8153	9578	10079	5640	+ 5,2	- 6,8	-	-

х) (в границах бывш. АССР)

Заболеваемость на 10 тыс. населения по Союзу составляет 63,9.

По РСФСР наиболее высокие показатели заболеваемости приходится на: Калининскую АССР - 193,4; Свердловскую обл. - 141,1; Краснодарский край - 137,0; АССР - Коми - 135,9; Челябинскую обл. - 127,5; гор. Ленинград - 102,0.

Заболееаемость коклюшем в 1939 г. продолжала увеличиваться. При незначительном увеличении заболееаемости по Союзу на 3,5%, в отдельных республиках наблюдался большой рост заболееаемости: по Таджикской ССР + 33,9%; Туркменской ССР + 33,1%; РСФСР + 19,0%. Особенно большой рост отмечен на ж.дор. транспорте + 60,1% и Водном транспорте + 42,0%.

В I-м полугодии 1940 г. заболееаемость коклюшем по СССР в целом осталась на уровне соответствующего периода прошлого года. В то же время, в некоторых республиках наблюдается значительный рост заболееаемости.

Заболело коклюшем (человек)

Наименование республик	1937г.	1938г.	1939г.	I по- лугодие 1940г.	% изме- нения (+) 1939г. к 1938г.	% из- менения I полу- год. 1940г. к I по- лугодию 1939г.	Заболееаемость на 10.000 нас.	
							в 1938г.	в 1939г.
С С С Р	385624	441971	457297	187054	+ 3,5	- 0,5	25,9	26,8
В т.ч.								
Р С Ф С Р	238426	261004	310555	117621	+19,0	- 3,2	23,9	28,4
У С С Р	70066	104314	68121	30128	-34,7	- 2,7	33,7	22,0
Б С С Р	4778	12185	7699	1664	-36,8	-48,0	21,9	13,8
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР.	13067	8330	5623	3634	-32,5	+34,8	25,9	17,5
ГРУЗИНСКАЯ ССР	7022	8211	9003	4738	+ 9,6	- 9,7	23,2	25,4
АРМЯНСКАЯ ССР	4474	4023	5100	1944	+26,8	-30,7	31,4	39,8
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	3352	990	1318	937	+33,1	+16,5	7,9	10,5
УЗБЕКСКАЯ ССР	8056	10022	5508	5644	-45,0	+84,5	15,9	8,8
ТАДЖИКСКАЯ ССР	1696	1654	2214	1341	+33,9	+15,4	11,1	14,9
КАЗАХСКАЯ ССР	12363	11675	14493	8777	+24,1	+70,2	19,0	23,6
КИРГИЗСКАЯ ССР	3077	3360	3175	1079	- 5,5	-47,1	23,0	21,8
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР х)	447	655	937	430	+43,1	+17,8	14,0	20,0
МОЛДАВСКАЯ ССР х) .	1698	1894	2212	652	+22,1	-51,2	31,5	36,7
ж.д. транспорт	13402	10754	17221	7006	+60,1	+16,5	-	-
Водный транспорт . . .	3700	2900	4118	1459	+42,0	- 8,6	-	-

х) в границах бывш. АССР.

Заболелаемость на 10 тыс. населения по Союзу составляет 26,8.

По РСФСР наиболее высокие показатели заболеваемости имели место в Калмыцкой АССР - 55,4; Удмуртской АССР - 51,8; Мурманской области - 50,9; Челябинской обл. - 49,2; Северо-Осетинской АССР - 49,0; Краснодарском крае 48,5.

МАЛЯРИЯ

Заболееаемость малярией в СССР исчисляется миллионами. В 1939 г. зарегистрировано больных малярией свыше 3,5 миллионов, из них 2,5 млн. повторные случаи /рецидивы/.

В 1-м полугодии 1940 года заболееаемость малярией значительно снизилась. В среднем по Союзу снижение свежих заболеваний составляет - 27,7 %, а снижение рецидивов - 37,7 %.

Свежие заболевания малярией: /в тыс. человек/

Наименование республик.	1937 г.	1938 г.	1939 г.	1 полу- годие 1940 г.	% % изме- нения / + - / 1939 г. к 1938 году	% % изме- нения 1 полу- год. 1940 г. к 1 полу- годию 1939 г.	Заболееаемость на 10.000 населения в 1938 г.	в 1939г.
С С С Р	1195,0	1265,3	1111,0	445,7	- 12,2	- 27,7	74,2	65,2
В т.ч.								
РСФСР	499,7	845,4	791,8	362,0	- 6,3	- 19,5	77,4	72,4
УССР	528,3	273,1	175,9	42,3	- 35,6	- 60,5	88,2	56,8
БССР	11,0	8,2	14,5	6,5	+ 76,2	- 25,0	14,9	26,0
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР	41,5	24,9	19,9	4,1	- 20,0	- 43,3	77,4	62,0
ГРУЗИНСКАЯ ССР	33,0	25,5	6,4	1,0	- 75,1	- 45,0	71,9	17,9
АРМЯНСКАЯ ССР	5,3	6,0	4,0	0,5	- 32,9	- 50,9	46,9	31,5
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	4,9	3,4	7,2	1,3	+ 107,7	- 54,5	27,5	57,1
УЗБЕКСКАЯ ССР	17,6	27,3	33,5	8,4	+ 22,9	- 20,6	43,4	53,4
ТАДЖИКСКАЯ ССР	6,6	4,7	7,4	2,1	+ 56,4	- 5,9	32,0	50,0
КАЗАХСКАЯ ССР	14,1	18,0	25,4	10,0	+ 41,0	- 19,6	29,3	41,4
КИРГИЗСКАЯ ССР	5,9	5,2	5,8	1,0	+ 12,0	- 63,0	35,4	39,6
УРЕЛ-ФИНСКАЯ ССР х/	-	0,6	0,6	0,1	-	- 66,7	12,8	12,8
МОЛДАВСКАЯ ССР х/	5,6	3,9	2,3	0,2	- 41,0	- 83,4	64,8	38,2
Водный транспорт	21,5	19,1	16,3	6,2	- 14,6	- 31,2	-	-
В.д. транспорт	-	-	-	-	-	-	-	-

х/ В границах бывш. АССР

Наименование республик	1937 г.	1938 г.	1939 г.	1 полу- годие 1940 г.	% % из- менения / + - / 1939 г. к 1938 году	% % изме- нения 1 полу- год. 1940 г. к 1 по- лугодию 1939 г.	Заболелаемость на 10000 насел.	
							В 1938 г.	В 1939 г.
С С С Р	4883,1	3652,5	2471,5	892,9	- 32,3	- 37,7	225,3	145,0
В т.ч.								
РСФСР	3036,1	2296,9	1504,5	617,5	- 34,5	- 32,5	210,2	137,7
АССР	760,5	419,3	254,4	71,9	- 39,3	- 56,3	135,4	82,2
ССР	27,4	21,6	16,5	7,3	- 23,4	- 44,9	38,8	29,7
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР	293,8	242,4	162,5	34,8	- 33,0	- 52,9	755,1	506,1
ГРУЗИНСКАЯ ССР	274,2	253,2	129,7	36,9	- 48,8	- 47,9	714,8	366,3
АРМЯНСКАЯ ССР	78,3	53,7	44,3	11,6	- 17,6	- 34,6	418,9	345,3
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	44,5	26,1	21,2	7,9	- 19,0	- 22,1	208,2	168,7
УЗБЕКСКАЯ ССР	139,3	127,1	142,6	41,6	+ 12,1	- 33,3	202,4	226,9
ТАДЖИКСКАЯ ССР	41,2	41,9	46,1	17,0	+ 10,1	- 7,5	281,9	310,5
КАЗАХСКАЯ ССР	115,0	105,7	94,8	28,9	- 10,3	- 46,1	171,9	154,2
КИРГИЗСКАЯ ССР	18,0	19,4	21,4	5,5	+ 10,8	- 56,0	132,6	146,9
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР х/	1,3	1,2	0,9	0,1	- 25,0	- 85,7	25,6	19,2
ЛАЗАВСКАЯ ССР х/	8,9	6,7	4,4	0,7	- 34,3	- 76,4	111,3	73,1
Водный транспорт	44,6	37,3	28,2	11,2	- 24,3	- 40,1	-	-
Всего ж.д. транспорт хх/	230,3	187,3	121,6	53,4	- 35,1	- 29,4	-	-

х/ в границах бывш. АССР

х/ По ж.д. транспорту свежие заболевания и рецидивы указаны вместе.

При снижении зарегистрированных повторных случаев малярии по Союзу на 32,3 %, первичные заболевания дают снижение лишь на 12,2 %.

По РСФСР заболеваемость малярией на 10000 населения /свежими случаями/ составляет 72,5. Однако по следующим местностям заболеваемость значительно превышает средние показатели: Архангельская обл. - 233,4; Тамбовск. обл. - 214,5; Воронежская обл. - 212,8; АССР Коми - 210,0; Ивановская обл. - 167,9; Курская обл. - 161,8; Мордовская АССР - 160,7 и т.д.

Грипп наиболее массовое заболевание. В 1939 г. было зарегистрировано свыше II миллионов заболеваний гриппом. Наибольший процент роста заболеваемости дают Армянская ССР + 65,7% и БССР + 37,8%. По сравнению с 1937 г. заболеваемость гриппом увеличена вдвое, а по республикам Армянской, Белорусской, Узбекской рост заболеваемости более чем в три раза.

Заболеваемость гриппом в I-м полугодии 1940 г. уменьшилась, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, почти по всей территории Советского Союза.

Снижение составляет в среднем 15,8%.

Рост числа заболеваний отмечается только в БССР на 16,8%.

Заболело гриппом (тыс.чел.)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I полу- годие 1940г.	% изме- нения (+) 1939г. к 1938г.	% из- менения I полу- год. 1940г. к I по- лугод. 1939г.	Заболеваемость на 10.000 нас.	
							в 1938г.	в 1939г.
С С С Р	5823,4	11176,0	11678,0	6659,4	+ 4,5	- 15,8	655,6	685,1
в т.ч.								
Р С Ф С Р	1010,6	7248,5	7644,9	4367,8	+ 5,5	- 15,3	663,3	699,0
У С С Р	1002,6	2097,4	2034,1	1139,6	- 3,0	- 19,0	677,5	657,0
Б С С Р	56,8	153,1	210,9	163,9	+37,8	+ 16,8	274,8	378,9
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР	114,1	200,7	181,0	113,4	- 9,8	- 14,7	625,0	563,8
ГРУЗИНСКАЯ ССР	130,2	239,8	235,3	118,0	- 1,9	- 29,5	676,8	664,4
АРМЯНСКАЯ ССР	22,1	49,6	82,2	35,5	+65,7	- 41,4	387,1	641,6
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	12,8	29,4	30,3	10,0	+ 2,8	- 54,8	234,8	241,3
УЗБЕКСКАЯ ССР	37,4	110,2	115,4	53,7	+ 4,8	- 27,6	175,3	183,7
ТАДЖИКСКАЯ ССР	12,9	25,8	20,7	11,1	-19,7	- 9,1	173,6	139,4
КАЗАХСКАЯ ССР	74,1	172,1	153,2	85,4	-11,0	- 6,2	230,1	249,3
КИРГИЗСКАЯ ССР	19,4	38,5	28,8	16,5	-25,1	- 10,8	264,0	197,7
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР х)	13,9	34,7	37,8	19,0	+ 8,9	- 28,3	739,9	806,0
МОЛДАВСКАЯ ССР х)	6,4	17,2	19,9	11,3	+15,7	- 22,9	285,0	330,6
Жел.д. транспорт	214,7	601,7	726,9	431,4	+20,8	- 9,7	-	-
Водный транспорт ..	95,4	157,4	156,6	82,8	+ 0,5	- 22,3	-	-

х) в границах бывш.АССР

ОСПА НАТУРАЛЬНАЯ

В 1938 году было зарегистрировано 126 случаев оспы; из них в Узбекской ССР - 56 случаев.

В 1939 г. в СССР зарегистрированы только 2 случая натуральной оспы, имевшие место в Узбекской ССР в январе мес.

Заболеваемость cerebro-спинальным менингитом в 1939 г. по Союзу в сравнении с 1938 г. несколько уменьшилась. Однако в сравнении с 1937 г. рост заболеваемости составляет 16,4%. Особенно большой рост заболеваемости за 2 года имел место в Казахской ССР - на 167,6% и на жел.дор. транспорте - на 140,8%.

В I-м полугодии 1940 г. продолжался рост заболеваемости cerebro-спинальным менингитом, снизившийся несколько в течение 1939 года. Увеличение заболеваемости по Союзу в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составляет 102,8%. Исключительный рост заболеваемости наблюдается по Карело-Финской ССР где число заболеваний увеличилось в 12 раз, БССР в 9 раз, Молдавская ССР в 8 раз.

Заболело cerebro-спинальным менингитом (человек)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I по- лугодие 1940г.	% изме- нения (+) 1939г. к 1938г.	% из- менения I полу- год. 1940г. к I по- лугод. 1939г.	Заболеваемость на 10.000 нас.	
							в	в
							1938г.	1939г.
С С С Р	3537	10714	9940	13269	- 7,2	+102,8	0,6	0,6
в т.ч.								
Р С Ф С Р	5014	6403	6126	6464	- 4,3	+ 62,1	0,6	0,6
У С С Р	1927	2234	1882	2756	- 15,8	+109,3	0,7	0,6
БССР	381	395	397	2438	+ 0,5	+789,8	0,7	0,7
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР	206	224	158	111	- 29,5	+ 7,8	0,7	0,5
ГРУЗИНСКАЯ ССР . . .	253	327	261	232	- 20,2	+ 19,0	0,9	0,7
АРМЯНСКАЯ ССР	86	84	44	41	- 47,6	+ 57,7	0,7	0,3
ТУРКМЕНСКАЯ ССР . .	58	53	34	17	- 35,8	- 29,2	0,4	0,3
УЗБЕКСКАЯ ССР	230	300	276	156	- 3,0	- 19,2	0,5	0,4
ТАДЖИКСКАЯ ССР . . .	52	30	29	17	- 3,3	- 10,5	0,2	0,2
КАЗАХСКАЯ ССР	96	186	257	145	+ 38,2	+ 5,1	0,3	0,4
КИРГИЗСКАЯ ССР . . .	57	121	76	58	- 37,2	+ 56,8	0,8	0,5
Карело-Финская ССР х)	7	10	64	144	увел в 6,4 раз	увел в 12 раз	0,2	1,4
МОЛДАВСКАЯ ССР х)	26	38	33	176	- 13,2	+700,0	0,6	0,5
ж.д.транспорт	103	264	243	457	- 6,1	+189,2	-	-
Водный транспорт .	41	45	55	57	+ 22,2	+ 58,3	-	-
х) в границах АССР								

По РСФСР местностями наибольшей заболеваемости являются:
г. Ленинград и г. Москва, АССР Немцев Поволжья, Марийская АССР, Бурят-Монгольская
АССР, Северо-Осетинская АССР, Архангельская обл., Московская обл., Удмуртская АССР.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ЭНЦЕФАЛИТ.

90

Заболееваемость эпидемическим энцефалитом в 1939 году по Союзу оставалась почти на уровне 1938 года. Однако в республиках Узбекской, Таджикской и Казахской наблюдался рост заболеваемости; причем в Казахской ССР заболеваемость увеличилась в 6 раз. На протяжении последних лет резкое увеличение заболеваемости отмечается в восточных республиках и Армянской ССР.

В 1-м полугодии 1940 года число зарегистрированных заболеваний энцефалитом по СССР на 16,5% меньше соответствующего периода прошлого года. Увеличение числа заболеваний отмечается в двух республиках и на ж.д. транспорте.

Заболело эпидемическим энцефалитом (человек)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	1 полу- годие 1940г.	% из- менения (+ -) 1939г. к 1938г.	% из- менения 1 полу- год. 1940г. к 1 полуго- дию 1939 г.
С С С Р	977	1237	1269	570	+ 2,6	- 16,5
В т.ч.						
Р С Ф С Р	730	901	897	404	- 0,4	- 9,2
У С С Р	103	89	70	40	- 23,1	+ 8,1
Б С С Р	16	18	12	16	- 33,3	+100,0
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР	25	18	14	4	- 22,2	- 42,9
ГРУЗИНСКАЯ ССР	20	23	11	5	- 52,2	- 44,4
АРМЯНСКАЯ ССР	1	24	12	1	- 50,0	-
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	6	23	11	2	- 52,2	- 75,0
УЗБЕКСКАЯ ССР	25	38	71	23	+ 36,8	- 59,6
ТАДЖИКСКАЯ ССР	6	1	5	2	+400,0	- 50,0
КАЗАХСКАЯ ССР	29	22	139	57	+531,8	- 34,5
КИРГИЗСКАЯ ССР	9	73	15	6	- 79,5	- 53,8
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР х)	-	3	-	-	-	-
МОЛДАВСКАЯ ССР х) ..	2	2	-	-	-	-
Жел.дор.транспорт ...	-	н.св.	8	10	-	+150,0
Водный транспорт	5	2	4	-	-	-

х) в границах бывш. АССР

По РСФСР в 1989 г. наибольшее число заболеваний на 10.000 населения зарегистрировано: в Молотовской обл. - 250; в Хабаровском крае - 85; в приморском крае - 41. Большое число заболеваний в указанных областях отчасти объясняется лучшей постановкой регистрации и учета энцефалита, в связи с открытием анаэробных отделений при местных бактериологических институтах.

ПОЛИОМИЭЛИТ

88

Заболеваемость полиомиэлитом в 1939 году увеличилась на 8,3%. Наибольший рост заболеваемости падает на республики: Украинскую, Туркменскую, Киргизскую, Казахскую и на жел.дор.транспорт.

Заболеваемость полиомиэлитом в 1939 г. по сравнению с 1937 годом возросла по СССР в 2 раза, а по Туркменской и Казахской республикам заболеваемость возросла в 12-20 раз.

В I-м полугодии 1940 г. заболеваемость полиомиэлитом по СССР в целом снижена на 20,7%. В то же время имеется увеличение числа заболеваний в некоторых республиках:

Заболело полиомиэлитом (человек)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I полуго- дие 1940г.	% из- менения (+ -) 1939г. к 1938г.	% изме- нения I полугод. 1940 г. к I по- лугод. 1939г.
С С С Р	735	1344	1455	528	+ 8,3	- 20,7
в т.ч.						
Р С Ф С Р	491	858	800	562	- 6,8	- 9,7
У С С Р	55	90	232	56	+213,3	- 8,9
Б С С Р	2	46	7	1	- 84,8	- 75,0
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР	15	36	12	13	- 66,7	+ 85,7
ГРУЗИНСКАЯ ССР	68	70	29	4	- 58,6	- 81,8
АРМЯНСКАЯ ССР	9	17	16	2	- 5,9	- 77,8
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	5	16	61	1	+281,3	- 85,7
УЗБЕКСКАЯ ССР	48	90	80	1	- 11,1	- 98,5
ТАДЖИКСКАЯ ССР	19	25	9	7	- 64,0	+ 75,0
КАЗАХСКАЯ ССР	5	59	99	69	+ 87,8	+ 38,0
КИРГИЗСКАЯ ССР	8	10	29	6	+190,0	- 75,0
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР х)	-	-	1	-		
МОЛДАВСКАЯ ССР х)	6	-	2	2		+100,0
Жел.дор.транспорт	-	18	28	4	+ 55,6	- 42,9
Водный транспорт	4	9	-	-	-	-

х) в границах бывш. АССР

По территории РСФСР наибольшая заболеваемость отмечается в Крымской АССР; Северо-Осетинской АССР; Бурят-Монгольской АССР, Читинской обл., Ростовской обл.

ВОЗВРАТНЫЙ ТИФ

86

Заболелаемость возвратным тифом за последние годы уменьшается.

Заболело возвратным тифом (человек)

Наименование республик.	1937г.	1938г.	1939г.	I полугод. 1940г.	% из-менения (+ -) 1939г. к 1938г.	% из-менения 1 полугод. 1940г. к 1 полугод. 1939г.
С С С Р	720	372	271	89	- 27,2	- 52,9
в т.ч.						
Р С Ф С Р	194	89	12	36	- 86,5	в 36 раз
У С С Р	-	-	-	-	-	-
БССР	-	-	-	-	-	-
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР	49	10	9	5	- 10,0	+ 66,7
ГРУЗИНСКАЯ ССР	-	-	-	-	-	-
АРМЯНСКАЯ ССР	4	-	-	-	-	-
ТУРКМЕНСКАЯ ССР	27	14	2	-	- 85,7	-
УЗБЕКСКАЯ ССР	186	69	17	15	- 75,4	+ 36,4
ТАДЖИКСКАЯ ССР	36	36	9	12	- 75,0	+ 140,0
КАЗАХСКАЯ ССР	107	129	123	9	- 4,7	- 88,5
КИРГИЗСКАЯ ССР	46	14	89	7	+ 535,7	- 92,0
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР х)	-	-	-	-	-	-
МОЛДАВСКАЯ ССР х)	-	-	-	-	-	-
Жел.дор.транспорт	13	9	10	5	+ 11,1	+ 25,0
Водный транспорт	8	2	-	-	-	-

х) в границах бывш. АССР

85

Миллер /Финко/

No I